

Příbalová informace: informace pro pacienta

Progesteron Besins 200 mg měkké vaginální tobolky progesteronum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Progesteron Besins a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Progesteron Besins užívat
3. Jak se přípravek Progesteron Besins užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Progesteron Besins uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Progesteron Besins a k čemu se užívá

Přípravek Progesteron Besins obsahuje hormon nazývaný progesteron.

K čemu se přípravek Progesteron Besins používá

Přípravek Progesteron Besins se používá na podporu těhotenství při cyklech umělého oplodnění (in vitro fertilizace, IVF) nebo k zabránění předčasnému porodu u jednočetného těhotenství u některých žen.

Podpora těhotenství

Přípravek Progesteron Besins se používá u žen, které potřebují dodávat progesteron během léčby v rámci programu asistované reprodukce (ART).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Progesteron Besins používat

Nepoužívejte přípravek Progesteron Besins

- jestliže jste alergická (přecitlivělá) na sóju
- jestliže jste alergická na léčivou látku progesteron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- jestliže máte závažné onemocnění jater
- jestliže máte nevysvětlitelné krvácení z pochvy
- jestliže máte rakovinu prsu nebo pohlavního ústrojí
- jestliže máte tromboflebitidu (žilní zánět provázený krevní sraženinou)

- jestliže máte nebo jste někdy měla krevní sraženinu v žíle (trombóza), např. v dolní končetině (hluboká žilní trombóza) nebo plicích (plicní embolie)
jestliže máte krvácení do mozku
- jestliže máte krevní onemocnění nazývané porfyrie, které je dědičné
- jestliže jste těhotná, ale dítě v děloze zemřelo (tzv. zamlklý potrat).

Upozornění a opatření

Přípravek Progesteron Besins se má používat během prvních 3 měsíců těhotenství. Před použitím přípravku Progesteron Besins se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Progesteron Besins není antikoncepce.

Jestliže se domníváte, že jste potratila, poraďte se s lékařem, protože bude nutné, abyste ukončila léčbu přípravkem Progesteron Besins.

Děti

Přípravek Progesteron Besins není určen pro děti.

Další léčivé přípravky a přípravek Progesteron Besins

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Platí to i pro volně prodejné léky včetně rostlinných přípravků. Přípravek Progesteron Besins totiž může ovlivnit účinek některých léků. Také jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Progesteron Besins.

Zejména informujte lékaře, jestliže užíváte následující léky:

- bromokriptin používaný při problémech s hypofýzou nebo u Parkinsonovy choroby
- cyklosporin (používaný k tlumení imunitního systému)
- léky s obsahem rifampicinu (používané k léčbě infekcí)
- ketokonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí).

Přípravek Progesteron Besins s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Progesteron Besins se zavádí do pochvy. Jídlo a pití nemá na léčbu žádný vliv.

Těhotenství, kojení a plodnost

- Přípravek Progesteron Besins podpoří otěhotnění, pokud podstupujete léčbu neplodnosti. Použití viz bod 3.
- Přípravek Progesteron Besins nepoužívejte v období kojení.

Přípravek Progesteron Besins obsahuje sójový lecithin.

Jestliže jste alergická na arašídny či sóju, nepoužívejte tento léčivý přípravek.

3. Jak se přípravek Progesteron Besins používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

- Přípravek se zavádí hluboko do pochvy.
- Neužívejte tento přípravek ústy. Při náhodném užití ústy Vám však neuškodí, pouze sníží šance na otěhotnění.

Doporučená dávka přípravku

Podpora během cyklů in vitro fertilizace (IVF)

- Léčba začne v den přenosu embrya.
- Každý den použijte jednu 200mg tobolku přípravku Progesteron Besins ráno, v poledne a večer, dle pokynů lékaře.
Pokud laboratorní test prokáže těhotenství, pokračujte ve stejném dávkování až do 7. až 12. týdne těhotenství dle pokynů lékaře.

Prevence předčasného porodu u některých žen

- Každý den použijte jednu 200mg tobolku přípravku Progesteron Besins večer před spaním přibližně od 20. do 34. týden těhotenství.

Jestliže jste použila více přípravku Progesteron Besins, než jste měla

V takovém případě kontaktujte lékaře nebo jděte do nemocnice. Vezměte s sebou balení přípravku. Předávkování se může projevit: závratí či únavou.

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Progesteron Besins

- Jestliže jste zapomněla použít dávku, zaveďte si tobolku, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží čas zavedení další dávky, zapomenutou dávku vynechte.
- Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit):

- Výtok z pochvy
- Krvácení z pochvy
- Svědění.

Hlášení nežádoucích účinků

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Progesteron Besins uchovávat

- Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí
- Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
- Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.
- Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Progesteron Besins obsahuje

- Léčivou látkou je progesteronum. Jedna tobolka obsahuje progesteronum 200 mg.
- Pomocné látky jsou čištěný slunečnicový olej a sójový lecithin. Obal tobolky obsahuje želatinu, glycerol, oxid titaničitý (E171) a čištěnou vodu.

Jak přípravek Progesteron Besins vypadá a co obsahuje toto balení

- Přípravek Progesteron Besins jsou oválné nažloutlé měkké tobolky obsahující téměř bílou olejovou suspenzi.
- Dodává se v krabičkách s PVC/Al blistry obsahujících 15, 21, 45 nebo 90 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Besins Healthcare Ireland Limited
16 Pembroke Street Upper Dublin
2, D02 HE63
Irsko

Výrobce

Cyndeia Pharma, S.L.
Poligono Industrial Emiliano Revilla Sanz
Avenida de Agreda, 31 Ólvega 42110
(Soria)
Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP schválen pod následujícími názvy:

Bulharsko: Utrogestan 200 mg vaginal capsules, soft Chorvatsko: Utrogestan 200 mg meke kapsule za rodnicu.

Česká republika: Progesteron Besins 200 mg měkké tobolky

Estonsko: Utrogestan 200 mg vaginaalpehmekapslid

Maďarsko: Utrogestan 200 mg lágy hüvelykapszula

Irsko: Utrogestan Vaginal 200mg Vaginal Capsules, soft

Lotyšsko: Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas

Litva: Progesterone Besins 200 mg makšties minkštosios kapsulės

Nizozemsko: Utrogestan 200 mg, zachte capsules voor vaginaal gebruik

Norsko: Utrogestan 200 mg vaginalkapsler, myke

Polsko: Utrogestan 200 mg, kapsułki dopochwowe, miękkie

Slovenská republika: Utrogestan 200 mg mäkké vaginálne kapsuly Slovinsko:

Utrogestan 200 mg mehke vaginalne kapsule

Švédsko: Utrogestan 200 mg mjuk Vaginalkapsel, mjuk

Velká Británie: Utrogestan Vaginal 200mg Capsules

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 1. 2021